

**Лікарські засоби, закуплені Чернівецьким обласним медичним
діагностичним центром для загальних захворювань (невідкладна
допомога)**

Придбано за кошти медсубвенції та спеціального фонду
Залишки станом на 07.02.2020

| Торгова назва | Один.в иміру | Форма випуску | К-ть |
|-------------------|-----------------|--|------|
| Аналгін | уп. | 5%, 2 , №10 | 1,1 |
| Атропін | уп. | 0,1% 1,0 №10 | 1,2 |
| Атропіна сульфат | уп. | 0,1% 1,0 №10 | 0,3 |
| Адреналін | уп. | Розчин для ін'єкцій 0,1 % по 1 мл в ампулах № 10 | 2,3 |
| Беротек 100 | шт. | 200 доз | 2 |
| Беродуал 200 доз | уп. | Розчин для інгаляцій, 100 мл | 3 |
| Баралгін | шт. | 5,0 N5 | 0 |
| Бинт нестерильний | шт. | 7*14 см в упаковці | 52 |
| Вентомін | шт. | Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах № 1 | 5 |
| Валідол | уп. | Таблетки №10 у блістерах | 0 |
| Вода для ін'єкцій | шт. | Розчинник д/парентер. заст. по 2 мл в амп. №10 | 1 |
| Вазелінова олія | шт. | | 17 |
| Вата нестерильна | шт. | 100 гр в упаковці | 255 |
| Гідрокортизон | уп. | 2,5% - 2,0, | 1,5 |
| Глюкоза 5% 200,0 | шт. | | 2,1 |
| Глюкоза 40% | уп. | 20,0 №10 | 2 |
| Голки | уп. | 0,4*40,0№100 | 5 |
| Гекодез | амп. | Розчин для інекцій 6%, 200 мл | 2 |
| Гепарин | уп. | Розчин для інекцій 5000 мо/мл по мл у флаконах №5 | 2 |

| | | | |
|----------------|------|--|------|
| Дексалгін | уп. | Розчин для ін'єкцій, 2 мл в ампулах №5 | 1,6 |
| Дексаметазон | уп. | Розчин для ін'єкцій, 3 мг № 5 | 4,6 |
| Дібазол | уп. | 5,0 мг №10 | 2,7 |
| Дофамін | уп. | 4% - 5,0 | 0,6 |
| Дицинон | уп. | 2 №50 | 0,5 |
| Димедрол | уп. | Розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах № 10 | 10,4 |
| Еуфілін 5,0 | уп. | Розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах № 10 | 1 |
| Кардіодарон | уп. | 3,0№10 | 0,5 |
| Каптопрес | уп. | Таблетки № 20 у контурних чарункових упаковках | 3,5 |
| Кальція хлорид | уп. | Розчин для ін'єкцій 10% по 5,0 мл в ампулах № 10 | 5 |
| Корглікон | уп. | Розчин для ін'єкцій 0,06% 1,0 №10 | 0,3 |
| Катетер в/в | шт. | 0,9*25 | 22 |
| Лідокаїн 10% | наб. | Аерозоль | 3 |
| Лазікс | уп. | 1%-2,0 | 2 |
| Лідокаїн 2% | уп. | Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10 | 3 |
| Магнія сульфат | уп. | Розчин для ін'єкцій 25% № 10 | 3,6 |
| Мезотон | уп. | Розчин для ін'єкцій 2мл № 10 | 0,4 |
| Новоканоїмід | уп. | 10% 5,0 | 0 |
| Но-шпа | уп. | Таблетки по 2,0мг № 25 | 0,28 |
| Натрій хлорид | шт. | Розчин 0,9% 200мл | 14 |
| Натрій хлорид | шт. | Розчин 0,9% 400мл | 5 |
| Нітрогліцерин | уп. | Таблетки під'язикові по 0,5 мг № 40 | 0 |

| | | | |
|--------------------|------|--|-------|
| Офтальмодек | шт. | Краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл у флаконах | 6 |
| Пластир | уп. | 3,0*500 | 9 |
| Пластир бактериц. | шт. | | 82 |
| Папазол | шт. | | 10 |
| Папаверін | уп. | Розчин для ін'єкцій 2% по 2 мл в ампулах № 10 | 1,7 |
| Преднізолон | уп. | 1,0 №5 | 0,4 |
| Перикис водню | шт. | Розчин для зовнішнього застосування 35% 5л, каністра | 80 |
| Розчин аміаку | фл. | Розчин 10% по 40 мл у флаконах | 22 |
| Сальбутамол аер. | амп. | Аерозоль для інгаляцій, дозований, 100 мкг/дозу по 200 доз у балонах № 1 | 1 |
| Спазмалгон | уп. | Розчин для ін'єкцій | 5,7 |
| Система В/В | шт. | Стерильна, одноразова | 15 |
| Спирт левоміцитин. | шт. | Розчин спиртовий по 40 мл | 3 |
| Супрастин | уп. | Розчин для ін'єкцій по 1 мл (20 мг) в ампулах № 5 | 1,8 |
| Фіз. розчин 0,9% | уп. | Розчин для інфузій 5,0 №10 | 19 |
| Шприци | шт. | Стерильні, одноразові | 27500 |

Головний лікар
Головний бухгалтер



Вдовічен А.М.
Колесник О.О.